I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 03 POSTI DI INFERMIERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C - CCNL FUNZIONI LOCALI).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 33/2013, SI PUBBLICANO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA ESTRATTE E NON ESTRATTE NELLA GIORNATA DEL 10/11/2021

TRACCIA N° 1

D1	Definizione di *Barthel Index*
1) Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano.	
2) Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane.	
3) Uno degli strumenti più utilizzati per accertare il bisogno assistenziale della persona.	
4) Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale	

D2	Definizione di "Compliance"
1) Grado di adesione della persona assistita al programma terapeutico prescritto	
2) Difficoltà da parte della persona assistita ad assumere i farmaci per os	
3) Difficoltà da parte del care giver a seguire la persona assistita	
4) Nessuna delle precedenti	

D3	Come si presenta una lesione da decubito di secondo stadio
1) Perdita di cute a tutto spessore con danno o necrosi dei tessuti sottocutanei che non si estendono alla fascia e all'osso	
2) Cute integra che non regredisce alla digitopressione.	
3) Perdita di cute con distruzione estesa e tessuto necrotico che si estende all'osso	
4)Perdita di cute non a tutto spessore che interessa l'epidermide e/o il derma	

D4	Per diluire una soluzione
1) Devo aggiungere sale	
2) Prima devo aggiungere sale e poi acqua	
3) Devo aggiungere solvente	
4) Nessuna delle precedenti	

D5	Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di
1) Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione.	
2) Penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva.	
3) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto.	
4) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta.	

D6	Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare non corretta?
1) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani	
2) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani	
3) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario	
4) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso	

D7	Cosa significa una somministrazione di sostanze per via parenterale
1) L'introduzione di sostanze per via aerea	
2) L'introduzione di sostanze nell'organismo attraverso una via diversa da quella gastrointestinale	
3) L'introduzione di sostanze attraverso una sonda gastrica	
4) L'introduzione di sostanze mediante una sonda inserita chirurgicamente nello stomaco	

D8	Definizione di pandemia
1) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un piccolo territorio	
2) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in breve periodo di tempo in un territorio molto ampio	
3) Succedersi continuo e costante di un piccolo numero di casi in un certo territorio	
4) Nessuna delle precedenti	

D9	Nella fase precoce di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da:
1) Vomito fecaloide	
2) Dolori addominali di tipo crampiforme	
3) Febbre	
4) Tutte le precedenti	

D10	Quale scala di valutazione del dolore viene utilizzata in un paziente che non riesce a comunicare:
1) Scala Tinetti	
2) Scala Conley	
3) Scala Noppain	
4) Scala Morse	

D11	Un paziente presenta versamento libero peritoneale, splenomegalia, emorroidi, deficit coagulativi e ipoalbuminemia. Ci si orienta verso
1) Scompenso cardiaco congestizio	
2) Neoplasia cerebrale	
3) Cirrosi epatica	
4) Morbo di Parkinson	

D12	Quali sono i sintomi di un paziente affetto da scompenso cardiaco
1) Dispnea	
2) Tosse	
3) Edemi arti inferiori	
4) Tutte le precedenti	

D13	La raccolta urine delle 24 ore a scopo diagnostico deve iniziare
1) Al mattino, vescica vuota, scartando la prima minzione	
2) Alle ore 22.00	
3) Prima di pranzo	
4) Nessuna delle precedenti	

D14	Per agnosia si intende
1) Un disturbo centrale del linguaggio	
2) Un disturbo dello svolgimento di attività motorie	
3) Un' incapacità a riconoscere ed identificare oggetti e persone	
4) Un disturbo di concentrazione e attenzione	

D15	L'antisepsi consiste in
1) Scomposizione di particelle di grasso più grandi in più piccole	
2) Rispetto delle norme igieniche per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri	
3) Sterilizzazione di tessuti viventi	
4) Disinfezione di tessuti viventi	

D16	Le informazioni sullo stato di salute di un paziente in una struttura sanitaria possono essere fornite solo
1) A tutti i visitatori	
2) Alla persona di riferimento indicata in fase di ingresso	
3) Ai parenti	
4) Nessuna delle precedenti	

D17	Definizione di ritenzione urinaria
1) Incontinenza	
2) Ristagno e accumulo di urina nella vescica	
3) Ridotta presenza di urina in vescica	
4) Nessuna delle precedenti	

D18	Cosa si intende con il termine oliguria
1) Frequente necessità di urinare durante il riposo notturno	
2) Emissione dolorosa di piccole quantità di urine	
3) Emissione di urine con difficoltà	
4) Ridotta quantità di urine prodotte nelle 24 h	

D19	Attualmente l'esercizio professionale dell'infermiere è regolamentato da
1) Costituzione, codice deontologico, contratto di lavoro	
2) Codice penale, codice civile, profilo professionale	
3) Costituzione e disposizioni di legge	
4) Profilo professionale, codice deontologico, formazione svolta	

D20	Con il termine farmaco LASA si fa riferimento
1) Ad un farmaco che può essere confuso con altri per la notevole somiglianza grafica e/o fonetica del nome (generalmente riferendosi al nome commerciale)	
2) Ad un farmaco che può essere utilizzato in sostituzione di un altro	
3) Ad un farmaco che può essere utilizzato solo se correttamente diluito	
4) Nessuna delle precedenti	

D21	La scala di Braden
1) È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati	
2) È uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano	
3) È uno strumento per la valutazione del rischio di cadute del bambino	
4) È uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione	

D22	Il rapporto compressioni/ventilazioni nel BLS deve corrispondere a:
1) 12 : 2	
2) 30 : 2	
3) 5 : 1	
4) 7 : 2	

D23	Cosa si intende per escara?
1) Una lesione da grattamento	
2) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma	
3) Una lesione lieve e transitoria della cute	
4) Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi	

D24	In caso di ipotensione bisogna sdraiare la persona:
1) Sul fianco destro in posizione fetale	
2) Sul fianco sinistro in posizione fetale	
3) Sulla schiena e alzarle le gambe	
4) Nessuna delle precedenti	

D25	L'angina pectoris è spesso provocata da
1) Vomito	
2) Prolungata posizione distesa	
3) Assunzione di alcolici	

D26	Quando si mobilizza un paziente con catetere vescicale, la sacca delle urine deve essere posizionato
1) È indifferente la posizione	
2) Appena sopra il livello della vescica	
3) Sotto il livello della vescica	

4) Sforzi fisici intensi	
D27	Su quale sistema sotto riportato un prolungato allettamento del paziente porta conseguenze
1) Respiratorio	
2) Muscolo - scheletrico	
3) Cutaneo	
4) Tutti i precedenti	

4) Come richiede il paziente	
D28	Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da
1) Secchezza della cute e palpitazioni	
2) Bradicardia, palpitazioni	
3) Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria	
4) Ipertensione, cefalea	

D29	L'espansione della gabbia toracica in un anziano è favorita da
1) Decubito laterale con sostegno di cuscini	
2) Posizione seduta	
3) Posizione supina con gambe flesse	
4) Decubito laterale destro	

D30	Quale tra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico è un dato oggettivo?
1) Il valore della pressione arteriosa è 135/70mmHg	
2) Ho un forte mal di testa alla sera	
3) Mi sento accaldato, credo di avere la febbre	
4) Dopo il pasto ho spesso mal di stomaco, credo sia gastrite	

TRACCIA N° 2

D1	L'indice di Barthel è
1) Uno degli strumenti più utilizzati per accertare il bisogno assistenziale della persona.	
2) Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale	
3)Uno strumento non più utilizzato per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano.	
4) Uno strumento per valutare le competenze dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane	

D2	Definizione di "compliance"
1) Grado di adesione della persona assistita al programma terapeutico prescritto	
2) Difficoltà da parte del paziente ad assumere i farmaci per os	
3)Difficoltà da parte del care giver ad accettare la malattia del proprio caro	
4)Nessuna delle precedenti	

D3	Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:
1) Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione.	
2) Pennarello indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina e si scrive nuovamente la richiesta nella pagina successiva.	
3) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto.	
4) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta.	

D4	Come si presenta una lesione da decubito di secondo stadio
1) Perdita di cute a tutto spessore con danno o necrosi dei tessuti sottocutanei che non si estendono alla fascia e all'osso	
2) Cute integra che non regredisce alla digitopressione	
3) Perdita di cute con distruzione estesa e tessuto necrotico che si estende all'osso.	
4) Perdita di cute non a tutto spessore che interessa l'epidermide e/o il derma	

D5	Cosa significa una somministrazione di sostanze per via parenterale:
1) L'introduzione di sostanze per via aerea	
2) L'introduzione di sostanze nell'organismo attraverso una via diversa da quella gastrointestinale	
3) L'introduzione di sostanze attraverso una sonda gastrica	
4) L'introduzione di sostanze mediante una PEG	

D6	Definizione di pandemia
1) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un piccolo territorio	
2) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in breve periodo di tempo in un territorio molto ampio	
3) Succedersi continuo e costante di un piccolo numero limitato di casi sempre nello stesso paese	
4) Nessuna delle precedenti	

D7	Nella fase precoce di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da
1) Vomito fecaloide	
2) Dolori addominali di tipo crampiforme	
3) Febbre	
4) Tutte le precedenti	

D8	Quale scala di valutazione del dolore viene utilizzata in un paziente che non riesce a comunicare:
1) Scala di Noppain	
2) Scala Tinetti	
3) Scala Conley	
4) Scala Morse	

D9	Un paziente presenta versamento libero peritoneale, splenomegalia, emorroidi, deficit coagulativi e ipoalbuminemia. Ci si orienta verso
1) Scompenso cardiaco congestizio	
2) Morbo di parkinson	
3) Cirrosi epatica	
4) Neoplasia cerebrale	

D10	Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto a
1) Alterazioni visive	
2) Instabilità nella deambulazione	
3) Fattori ambientali/di situazione	
4) Tutte le precedenti	

D11	La raccolta urine delle 24 ore a scopo diagnostico deve iniziare
1) Al mattino, vescica vuota, scartando la prima minzione	
2) Alle ore 22.00	
3) Prima di pranzo	
4) Nessuna delle precedenti	

D12	Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare non corretta?
1) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani	
2) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani	
3) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario	
4) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso	

D13	Per agnosia si intende
1) Un disturbo centrale del linguaggio	
2) Un disturbo dello svolgimento di attività motorie	
3) Un' incapacità a riconoscere ed identificare oggetti e persone	
4)) Un disturbo di concentrazione e attenzione	

D14	Le informazioni sullo stato di salute di un paziente in una struttura sanitaria possono essere fornite solo:
1) Ai parenti	
2) Alla persona di riferimento indicata in fase di ingresso	
3) A tutti i visitatori	
4) Nessuna delle precedenti	

D15	Definizione di ritenzione urinaria:
1) Minzione dolorosa	
2) Ristagno e accumulo di urina nella vescica	
3) Ridotta presenza di urina in vescica	
4) Nessuna delle precedenti	

D16	L'antisepsi consiste in
1) Scomposizione di particelle di grasso più grandi in più piccole	
2) Rispetto delle norme igieniche per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri	
3) Sterilizzazione di tessuti viventi	
4) Disinfezione di tessuti viventi	

D17	Attualmente l'esercizio professionale dell'infermiere è regolamentato da
1) Costituzione, codice deontologico, contratto di lavoro	
2)) Codice penale, codice civile, profilo professionale	
3) Costituzione e disposizioni di legge	
4) Profilo professionale. codice deontologico, formazione svolta	

D18	Con il termine farmaco LASA si fa riferimento:
1) Ad un farmaco che può essere confuso con altri per la notevole somiglianza grafica e/o fonetica del nome (generalmente riferendosi al nome commerciale).	
2) Ad un farmaco che può essere utilizzato in sostituzione di un altro	
3) Ad un farmaco che richiede il piano terapeutico	
4) Nessuna delle precedenti	

D19	La scala di Braden
1) È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati	
2) È uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano	
3) È uno strumento per la valutazione del rischio di cadute del bambino	
4) È uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione	

D20	Il rapporto compressioni/ventilazioni nel BLS deve corrispondere a:
1) 12 : 2	
2) 30 : 2	
3) 5 : 1	
4) 7 : 2	

D21	Cosa si intende per escara?
1) Una lesione da grattamento	
2) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma	
3) Una lesione lieve e transitoria della cute	
4) Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi	

D22	In caso di ipotensione bisogna sdraiare la persona:
1)Sul fianco destro in posizione fetale	
2) Sul fianco sinistro in posizione fetale	
3) Sulla schiena e alzarle le gambe	
4) Nessuna delle precedenti	

D23	L'angina pectoris è spesso provocata da
1) Vomito	
2) Prolungata posizione distesa	
3) Assunzione di alcolici	
4) Sforzi fisici intensi	

D24	Cosa si intende con il termine oliguria
1) Frequente necessità di urinare durante il riposo notturno	
2)Emissione dolorosa di piccole quantità di urine	
3) Emissione di urine con difficoltà	
4) Ridotta produzione di urine nelle 24 h	

D25	Il "problem solving" è
1) Il piano di assistenza del paziente	
2) Una teoria psicologica	
3) Un' indagine strumentale	

D26	L'aspirazione endotracheale:
1) Non deve avere durata inferiore a 3 minuti	
2) Non deve durare più di 10 --15 secondi per non provocare effetti collaterali	
3) Deve essere prolungata per almeno 25-30 minuti per avere la certezza della rimozione delle	

4) Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi

secrezioni
4) È una procedura da eseguire senza guanti

D27	Prima di effettuare la Contenzione fisica sui pazienti, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:
1) L'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente	
2) C'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione.	
3) Sono stati tentati altri interventi meno restrittivi	
4) Tutte le precedenti.	

D28	Il sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso ha come peculiarità:
1) Dispositivo di svuotamento, membrana perforabile	
2)Dispositivo di svuotamento, raccordo per catetere	
3) Dispositivo di svuotamento, valvola antireflusso, membrana perforabile.	
4) Dispositivo di svuotamento	

D29	Quale tra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico è un dato oggettivo?
1) Il valore della pressione arteriosa è 135/70mmHg	
2) Ho un forte mal di testa alla sera	
3) Mi sento accaldato, credo di avere la febbre	
4) Dopo il pasto ho spesso mal di stomaco, credo sia gastrite	

D30	L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è:
1) L'uomo malato e la terapia	
2) L'uomo ed il suo bisogno di assistenza infermieristica	
3) L'uomo e le sue patologie	
4) L'uomo ed il suo ambiente di vita	

TRACCIA N° 3

D1	Come si presenta una lesione da decubito di secondo stadio
1) Perdita di cute a tutto spessore con danno o necrosi dei tessuti sottocutanei che non si estendono alla fascia e all'osso	
2) Cute integra che non regredisce alla digitopressione	
3) Perdita di cute con distruzione estesa e tessuto necrotico che si estende all'osso	
4) Perdita di cute non a tutto spessore che interessa l'epidermide e/o il derma.	

D2	Per diluire una soluzione:
1) Devo aggiungere sale	
2) Prima devo aggiunge sale e poi acqua	
3) Devo aggiungere solvente	
4) Nessuna delle precedenti	

D3	Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:
1) Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione.	
2) Penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina sbarrandola e riscrivendo la	

D4	Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare non corretta?
1) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani	
2) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani	

richiesta nella pagina successiva.
3) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto.
4) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta.

3) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
4) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso

D5	Cosa significa una somministrazione di sostanze per via parenterale:
1) L'introduzione di sostanze per via aerea	
2)L'introduzione di sostanze nell'organismo attraverso una via diversa da quella gastrointestinale	
3)L'introduzione di sostanze attraverso una sonda gastrica	
4)L'introduzione di sostanze mediante una sonda inserita chirurgicamente nello stomaco	

D6	Definizione di pandemia
1) Succedersi continuo e costante di un piccolo numero di casi in un certo territorio	
2) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in breve periodo di tempo in un territorio molto ampio	
3) Comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un piccolo territorio	
4) Nessuna delle precedenti	

D7	Nella fase precoce di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da:
1) Febbre	
2) Dolori addominali di tipo crampiforme	
3) Vomito fecaloide	
4) Tutte le precedenti	

D8	Quale scala di valutazione del dolore viene utilizzata in un paziente che non riesce a comunicare:
1)Scala Tinetti	
2)Scala Conley	
3)Scala Morse	
4)Scala Noppain	

D9	Un paziente presenta versamento libero peritoneale, splenomegalia, emorroidi, deficit coagulativi e ipoalbuminemia. Ci si orienta verso:
1) Morbo di Parkinson	
2) Neoplasia cerebrale	
3) Cirrosi epatica	
4) Scompenso cardiaco congestizio	

D10	Quali sono i sintomi di un paziente affetto da scompenso cardiaco:
1) Dispnea	
2) Edemi arti inferiori	
3) Tosse	
4) Tutte le precedenti	

D11	La raccolta urine delle 24 ore a scopo diagnostico deve iniziare:
1) Al mattino, vescica vuota, scartando la prima minzione	
2) Alle ore 22.00	
3) Prima di pranzo	
4) Nessuna delle precedenti	

D12	Cosa si intende con il termine oliguria:
1) Frequente necessità di urinare durante il riposo notturno	
2) Emissione dolorosa di piccole quantità di urine	
3) Emissione di urine con difficoltà	
4) Ridotta quantità di urine prodotte nelle 24 h	

D13	Per agnosia si intende
1) Un disturbo centrale del linguaggio	
2) Un disturbo dello svolgimento di attività motorie	
3) Un' incapacità a riconoscere ed identificare oggetti e persone	
4) Un disturbo di concentrazione e attenzione	

D14	Le informazioni sullo stato di salute di un paziente in una struttura sanitaria possono essere fornite solo:
1) A tutti i visitatori	
2) Alla persona di riferimento indicata in fase di ingresso	
3) Ai parenti	
4) Nessuna delle precedenti	

D15	Definizione di ritenzione urinaria
1) Incontinenza	
2) Ristagno e accumulo di urina nella vescica	
3) Ridotta presenza di urina in vescica	
4) Nessuna delle precedenti	

D16	L'antisepsi consiste in
1)) Scomposizione di particelle di grasso più grandi in più piccole	
2) Rispetto delle norme igieniche per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri	
3) Sterilizzazione di tessuti viventi	
4) Disinfezione dei tessuti viventi	

D17	Attualmente l'esercizio professionale dell'infermiere è regolamentato da
1)) Costituzione, codice deontologico, contratto di lavoro	
2) Codice penale, codice civile, profilo professionale	
3) Costituzione e disposizioni di legge	
4) Profilo professionale, codice deontologico, formazione svolta	

D18	Con il termine farmaco LASA si fa riferimento:
1) Ad un farmaco che può essere confuso con altri per la notevole somiglianza grafica e/o fonetica del nome (generalmente riferendosi al nome commerciale).	
2) Ad un farmaco che può essere utilizzato in sostituzione di un altro	
3) Ad un farmaco che può essere utilizzato solo per via intramuscolare	
4) Nessuna delle precedenti	

D19	La scala di Braden
1) È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati	
2) È uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano	
3) È uno strumento per la valutazione del rischio di cadute del bambino	
4) È uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione	

D20	Il rapporto compressioni/ventilazioni nel BLS deve corrispondere a:
1) 7 : 2	
2) 12: 2	
3) 5 : 1	
4) 30 : 2	

D21	Definizione di *Barthel Index:*
1) Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale.	
2)Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane.	
3)Uno degli strumenti più utilizzati per accertare il bisogno assistenziale della persona.	
4) Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano.	

D22	Definizione di "compliance":
1) Grado di adesione della persona assistita al programma terapeutico prescritto	
2) Difficoltà da parte della persona assistita ad assumere i farmaci per os	
3) Difficoltà da parte del care giver a comprendere il piano delle cure rivolte al proprio caro	
4) Nessuna delle precedenti	

D23	Cosa si intende per escara?
1)) Una lesione da grattamento	
2) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma	
3) Una lesione lieve e transitoria della cute	
4) Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi	

D24	In caso di ipotensione bisogna sdraiare la persona:
1) Sul fianco in posizione fetale	
2) In posizione prona con il volto rivolto a destra	
3) Sulla schiena e alzarle le gambe	
4) Nessuna delle precedenti	

D25	Al signor Luigi affetto da diabete viene prescritta la somministrazione di insulina Lispro (Humalog) ai pasti. Quali indicazioni darà l'infermiere?
1) Inizi a mangiare 10-15 minuti dopo essersi praticato l'insulina	
2) Inizi a mangiare un 'ora dopo la somministrazione	
3) Mangi due ore prima della somministrazione	
4) Non è necessario presidiare i tempi del pasto con questo tipo di insulina	

D26	Nella tecnica di iniezione intramuscolare, è indicato:
1) Evitare il massaggio in quanto può favorire la dispersione del farmaco	
2) Far assumere una posizione prona	
3) Iniettare rapidamente con velocità di 50 secondi/ml	
4) Mettere un cerotto sul punto di iniezione	

D27	Una paziente è alimentata con sondino naso-gastrico. Per ridurre il rischio di aspirazione la posizione corretta da garantire è
1) Prona 10°	
2) Laterale <30°	
3) Supina con testa alzata di 30°-45°	
4) Supina laterale destra	

D28	Quali sono i presupposti per un'efficace integrazione tra il personale?
1) Rispetto reciproco delle diverse competenze	
2) Assunzione delle responsabilità che rientrano nel proprio profilo di competenza	
3) Indicazioni organizzative chiare e non conflittuali	
4) Tutte le precedenti	

D29	L'angina pectoris è spesso provocata da
1) Vomito	
2) Prolungata posizione distesa	
3) Assunzione di alcolici	
4) Sforzi fisici intensi	

D30	Per valutare la presenza di dispnea il primo dato da rilevare in un paziente collaborante che suona il campanello:
1) Percezione riferita dal paziente circa la sua difficoltà di respiro	
2) Frequenza respiratoria	
3) Colorito cutaneo a livello delle mucose, in particolare per rilevare cianosi o pallore	
4) Saturazione dell'ossigeno	

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Alfonsina dott.ssa Pozzan